**Laboratoire de BIOLOGIE MEDICALE du CHU de LYON
GHS : LABORATOIRE DE BIOCHIMIE**

DOSAGE D'ANTI-INFECTIEUX DANS LE SANG

CBS : RENSEIGNEMENTS : ☎ : 04 78 86 38 64

Zone obligatoire à remplir par le préleveur Prescripteur : _____ Préleveur : _____ Téléphone : _____ Incident au cours du prélèvement : _____	Collet 1 étiquette patient comportant : N° de séjour : _____ Nom usuel : _____ Prénom : _____ Date de naissance : _____ Sexe : _____ Nom de naissance : _____
---	---

Date : **Heure :** URGENT 2019

RENS CLINIQUES WCP Centre de prélèvement SDIALYSE Dialyse
 Avant Pendant Après

Renseignements pour l'interprétation

Poids : _____ Créatinine : _____ Clairance : _____
 Dialyse : oui non Si oui, dernière dialyse le : _____ à _____ h
 Traitements associés : _____
 Motif de la demande : Surveillance thérapeutique Suspicion sous-dosage et d'inefficacité
 Suspicion de surdosage et de toxicité Problème de compliance au traitement
 Interactions médicamenteuses Modification posologique

Nature du prélèvement : sérum autre (préciser) : _____

ANTIBIOTIQUES : 5 ml de sang sur tube sec (bouchon rouge sans gel, réf. BD 365904)

Les cases laissées en blanc correspondent aux temps usuels de prélèvement pour chaque molécule (ne pas mettre une croix, bien noter l'heure exacte)

Nom de la molécule	Posologie journalière	Dernière Administration Date et heure	à : heures de prélèvement*						Perf. continue (2 x 12h ou 24h)
			Voie orale		Voie sous-cutanée		IV flash ou perf. discontinue		
			T0*	Tpic*	T0*	Tpic*	T0*	Tpic*	
Amoxicilline	 x mg/j								
Cefazoline	 x mg/j								
Cefepime	 x mg/j								
Cefotaxime	 x mg/j								
Cefoxitine	 x mg/j								
Ceftazidime	 x mg/j								
Ceftriaxone	 x mg/j								
Ciprofloxacine	 x mg/j								
Lévofloxacine	 x mg/j								
Moxifloxacine	 x mg/j								
Ofloxacine	 x mg/j								
Piperacilline	 x mg/j								

Daptomycine (SDAPTO)

Faire 3 prélèvements : T0 : mesure résiduelle (avant la perf. du jour) T1 à +30min après la fin de perf du jour T2 à +5 à 6h après la fin de perf du jour	Posologie : mg/perfusion et /j	Début de traitement : _____
Dernière perfusion avant la mesure résiduelle : Date : _____ heure de début : _____ h _____ min		Durée exacte de la perfusion le jour des prélèvements : Début : _____ h _____ min Fin : _____ h _____ min
Heures de prélèvement : T0 : _____ h _____ min T1 : _____ h _____ min T2 : _____ h _____ min		

*Les cases laissées en blanc correspondent aux temps usuels de prélèvement pour chaque molécule (ne pas mettre une croix, bien noter l'heure exacte).
Si autre temps de prélèvement, le noter dans la case T+...

Mode d'administration : per os IV

MEDICAMENTS ANTIFONGIQUES : 5 ml de sang sur tube sec (bouchon rouge sans gel, réf. BD 365904) par temps de prélèvement – si plusieurs temps, grouper les tubes bien identifiés dans un même sac et même envoi

Nom du médicament	Posologie journalière	Date de début du traitement	Dernière administration Date et heure	Prélèvement le :	à : heures de prélèvement*								
					T0	T+30' (ap. fin perf.)	T+1h (ap. fin perf.)	T+2h (per os)	T+3h (per os)	T+4h	T+5h	T+...	
Flucytosine (ANCOTIL®) - <i>SFLUCY</i>	 x mg/j												
Itraconazole (SPORANOX®) - <i>SITRAC</i>	 x mg/j												
Voriconazole (VFEND®) - <i>SVORIC</i>	 x mg/j												
Posaconazole (NOXAFIL®) - <i>SPOSAC</i> . suspension buvable	 x mg/j								si 3 fois/j		si 2 fois/j		
..... . comprimé	 x mg/j									T+4h à 5h			
..... . IV	 x mg/j												
Fluconazole (TRIFLUCAN®) - <i>SFLUCO</i>	 x mg/j												

MEDICAMENTS ANTI-TUBERCULEUX :

5 ml de sang sur tube sec (bouchon rouge sans gel, réf. BD 365904) par temps de prélèvement – tubes à transmettre dans la glace

Nom du médicament	Posologie journalière	Date de début du traitement	Dernière administration Date et heure	Prélèvement le :	à : heures de prélèvement*						
					T0	T +30 min (fin perf.)	T+2h30 (fin perf.)	T+2 à 3h (per os)	T+3h (per os)	T+...	
Isoniazide (RIMIFON®, RIFATER®, RIFINAH®) - <i>SINH</i>	 x mg/j										
Rifampicine (RIFATER®, RIFADINE®, RIFINAH®, RIMACTAN®) - <i>SRIFAM</i>	 x mg/j										
Rifabutine (ANSATIPINE®) - <i>SRIFAB</i>	 x mg/j										

MEDICAMENTS ANTIVIRAUX : 5 ml de sang sur tube hépariné (bouchon vert foncé sans gel, réf. BD 368496) tubes à transmettre dans la glace Analyse impossible sur tube sec

Pour les centres de Tri : centrifuger immédiatement le sang total à +4°C à 2000 g pendant 10 minutes et congeler le plasma à -20°C. Envoyer le prélèvement congelé au laboratoire exécutant l'analyse

Nom du médicament	Posologie journalière	Voie d'administration (per os ou IV)	Date de début du traitement à posologie constante	Dernière administration Date et heure	Prélèvement le :	à : heures de prélèvement*				
						T0	fin de perf. si IV	T+1.5 à 2h (per os)	T+2h (per os)	T+...
Aciclovir (ZOVIRAX®) - <i>SACICL</i>	 x mg/j									
Valaciclovir (ZELITREX®) - <i>SACICL</i>	 x mg/j									
Ganciclovir (CYMEVAN®) - <i>SGANCI</i>	 x mg/j									
Valganciclovir (ROVALCYTE®) - <i>SGANCI</i>	 x mg/j									